

OPERABILITA' DELLA MAMMELLA NEL RIMODELLAMENTO ESTETICO E CHIRURGICO DEL SENO SENZA PATOLOGIE NEOPLASTICHE IN 3 CASI ESAMINATI.

Francesca Pietrocarlo

OBIETTIVI: L'ATROFIA ghiandolare porta alla perdita del turgore nella mammella, tipico delle donne giovani. Il rimodellamento del seno è stato richiesto da 3 pazienti in età diverse, tutte e tre con motivazioni ed operabilità. **MATERIALI E METODI:** 1° caso: 30 anni, nubile, nullipara, in trattamento con contraccettivi, dieta sbilanciata, longitipo. 2° caso: normotipo, 2 gravidanze a termine con allattamento al seno. 40 anni. 3° caso: 45 anni, brachitipo, 3 gravidanze a termine, allattamento. **RISULTATI:** Riacquisizione di volume e forma con regolarità, 1° caso. Nel 2° e 3° caso anche del tono dopo l'allattamento. È stato utilizzato il silicone. **CONCLUSIONI:** Nessun danno, né conseguenze al controllo per le pazienti inviate dopo l'intervento.

BREAST SURGERY IN AESTETIC AND CHIRURGIC CASES WITHOUT NEOPLASTIC PATOLOGIES IN FERTILE AGE. 3 CASES.

OBIETTIVE: Gland atrophy causes loss of breast volume. A breast revitalization has been requested from 3 patients in different ages. All 3 patients motivated and with operability. **MATERIAL AND METHOD.** 3 cases: 1° woman 30 y.o. longitype. Assumes estrogen no son. Not equilibrated diet. 2° 40 y.o. normotype, 2 pregnancies with breast suction. 3° 45 y.o. 3 pregnancies, breast suction. brachitype. It has been used silicon in the surgery. **RESULT:** Form and volume ok. 1° case. In 2° and 3° case reintegration and tone improvement. **CONCLUSION:** No problem at the control visit in the 3 cases, send for silicon surgery.