

LIFTING MEDICO ZIGOMATICO-TEMPORALE MEDIANTE FILLER A BASE DI ACIDO IALURONICO VOLUMIZZANTE: ESPERIENZA PERSONALE

Alessio Redaelli

Il concetto che l'iniezione in un'area comporti effetti in un'altra limitrofa è stato confermato attraverso numerosi studi anatomici e clinici. In particolare l'autore porta la personale esperienza di sollevamento dell'area del terzo medio ed inferiore del volto mediante iniezioni limitrofe, zigomatiche o temporali. L'utilizzo di cannule smusse e l'iniezione in aree anatomiche ben selezionate, permettono di ottenere risultati apprezzabili per il lifting medico delle aree del terzo medio ed inferiore del volto, in assenza di complicanze maggiori.

L'autore evidenzia alcuni casi clinici pratici con i dettagli tecnici.

ZIGOMATICO-TEMPORAL LIFTING USING HIGH g1 HYALURONIC ACID FILLERS: PERSONAL EXPERIENCE

The concept that the injection in one area of the face leads to improving results in an other nearby area of the face has been confirmed by many scientific articles in the last years. The Author shows his personal experience in lifting of mid and lower face through injections in zigomatico-temporal area.

The use of blunt cannulas and injections in well defined anatomical areas allow get good results without important complications. Some clinical cases are showed.

1. Hernandez C. et Al.: Clinical validation of the temporal lifting technique using soft tissue fillers. JCD, Jul 2020, <https://doi.org/10.1111/jocd.13621>

2. Cotofana S. et Al: The six different injection techniques for the temple relevant for soft tissue filler augmentation procedures – Clinical anatomy and danger zones. JCD, July 2020, 17 May 2020, <https://doi.org/10.1111/jocd.13491>