

# Ringiovanimento della zona perioculare con filler dinamici

**Lucia Calvisi (1)**

Clinica Privata, Medicina e Chirurgia, Dermatologa, Cagliari, Italia (1)

## **Introduzione**

Il ringiovanimento dell'area perioculare è una richiesta frequente per i pazienti che vengono nel nostro studio. In realtà la combinazione di correzione del solco lacrimale e lifting del sopracciglio, soprattutto nei pazienti oltre i quarant'anni, sembra essere una tecnica molto potente.

## **Scopo dello studio**

Abbiamo analizzato la necessità di migliorare l'aspetto dell'area perioculare in termini di ringiovanimento, secondo le esigenze dei pazienti.

## **Materiali e metodi**

Abbiamo arruolato due diversi gruppi di pazienti.

Gruppo uno: pazienti che necessitano solo di una correzione dell'area del solco lacrimale;

Gruppo due: pazienti che necessitano di una correzione dell'area del solco lacrimale e di un lifting del sopracciglio.

Il filler utilizzato era in entrambi i gruppi di pazienti un acido ialuronico specifico, dedicato e approvato per l'area perioculare, un HA 15 mg/mL (HA reticolato ad alto peso molecolare + Non reticolato), più un cocktail di ingredienti per migliorare la qualità della pelle.

## **Risultati**

Entrambi i gruppi hanno mostrato un significativo miglioramento dell'area trattata durato mesi.

## **Conclusione**

Con il giusto filler e la giusta tecnica anche una zona difficile come quella perioculare, potrebbe essere migliorata con ottimi risultati.

# Rejuvenation of the periocular area with dynamic fillers

## Introduction

Rejuvenation of periocular area is a frequent demand for a patients that come in our office. Actually the combination of correction of tear trough and the eye brow lift, especially in patients over forty, appear to be a very powerful technique.

## Aim of the study

We analyzed the necessity to improve the appereance of the periocular area in terms of rejuvenation, according to the patients needs.

## Matherials and methods

We enrolled two different groups of patients.

Group one: patients that need only a correction of the tear trough area;

Group two: patients that need a correction of the tear trough area and a brow lift.

The filler used was in both group of patients a specific Hyaluronic acid, dedicated and approved to the periocular area, a HA 15 mg/mL ( Crosslinked HA with High molecular weight +Non cross linked), plus a Cocktail of ingredients for improvement the quality of the skin.

## Results

Both of the group shown a significant improvement in the area treated the lasted for months.

## Conclusion

With the right filler and the right technique even a difficult area like the periocular, could be improved with excellent result.

## Bibliografia

Hyaluronic Acid Gel Injection for the Treatment of Tear Trough Deformity: A Multicenter, Observational, Single-Blind Study.

Diaspro A, Calvisi L, Sito G.

Aesthetic Plast Surg. 2022 Aug;46(4):1860-1867. doi: 10.1007/s00266-022-02887-7.

Filler Enhancement of the Superior Periocular Area.

Woodward JA, Langelier N.

JAMA Facial Plast Surg. 2016 Dec 1;18(6):489-490. doi: 10.1001/jamafacial.2016.0636.

PMID: 27348180 Review. No abstract available.

Nonsurgical Rejuvenation of the Eyelids with Hyaluronic Acid Gel Injections.

Lee S, Yen MT.

Semin Plast Surg. 2017 Feb;31(1):17-21. doi: 10.1055/s-0037-1598189.

PMID: 28255285