Liplush analysis. Analisi dimensionale statica e dinamica del terzo inferiore del viso durante le procedure di ridefinizione e aumento volumetrico delle labbra con acido ialuronico.

Esperienza personale con filler HA CPM (Cohesive Polydensified Matrix)

Andrea Lazzarotto

Le labbra contribuiscono fortemente alla bellezza individuale e rappresentano l'elemento maggiormente caratterizzante del terzo inferiore del viso. La ridefinizione e il loro aumento volumetrico, mediante iniezione di acido ialuronico, rappresenta uno dei trattamenti medici estetici più richiesti ed effettuati.

Dal punto di vista tecnico il trattamento iniettivo delle labbra con acido ialuronico può risultare, soprattutto per gli operatori maggiormente esperti, una procedura non particolarmente complessa; ma al fine di ottenere un risultato armonioso e cioè bello ed elegante è di fondamentale importanza effettuare una corretta e approfondita analisi complessiva del viso e in particolare del terzo inferiore.

L'analisi non deve prendere in considerazione esclusivamente, come già più volte descritto, l'altezza del labbro superiore e del labbro inferiore ma l'attenzione deve essere focalizzata anche sulla distanza solco mentale-pogonion e sull'identificazione di eventuali deficit od eccessi trasversali e anteroposteriori del terzo inferiore del volto.

Alla valutazione statica descritta bisogna sempre associare una valutazione dinamica al fine di quantificare la corretta quantità di volume da iniettare secondo le più opportune modalità.

Un'analisi approfondita così strutturata fornisce preziose indicazioni sulle varie proporzioni anatomiche da rispettare e sulle varie modalità iniettive da seguire.

L'obiettivo è quello di istruire l'operatore ad effettuare una corretta e completa analisi del terzo inferiore del viso illustrando quali sono le proporzioni anatomiche da rispettare e le modalità iniettive più adeguate per ottenere un risultato finale ottimale.

KEYWORDS: labbra, analisi dimensionale, acido ialuronico, filler